




Zirkuläre Kunststoffwirtschaft – Herausforderungen, Ansätze und Weichenstellungen




Andreas Manhart | Digitales Forum „Kunststoffe von morgen – Kreislaufwirtschaft ohne Erdöl“ | 23.09.24

Globaler Blick auf die derzeitige Kunststoffwirtschaft




Potenzielle CO₂ Emissionen im Business-as-usual Szenario



IPCC:
Remaining total
greenhouse gas
emission budget for
achieving the 1.5°C
goal is 510 Gt CO_{2e}
(330 – 710 Gt CO_{2e})

Immer mehr Konzepte und Entwicklungen zu alternativen Rohstoffquellen

- Biokunststoffe
- Outdoorbekleidung aus „recycelten Autoreifen“
- Kunststoffverpackungen aus „CO2 aus Industrieabgasen“



Exkurs Depolymerisierung / Solvolyse

Comparably new approach for selected plastic types:




PA / Nylon (e.g. fishing nets)



PU (e.g. mattress-foam)




Polyester (e.g. textiles)




Potentials:

- Limited to some polymers
- Some of these polymers are thermosets (PU) that can only be recycled mechanically with severe quality losses (downcycling)
- Requires well-sorted inputs
- 5-10% of generated plastic waste




* The energy recovered during incineration is not considered in the energy data. Av. heating value LDPE, HDPE, PE = 41.2 MJ/kg → recovery: 11-14% electricity, 32-42% heat


Example of practical implementation (cascade concept)



Polymer & plastic data for Germany 2021



Improvement pathway (based on today's production, use & disposal)



Notes

* The differences in polymer production and plastic consumption volumes is mainly due to differences in scope (polymer production also entails production of textile fibres, paints, adhesives etc.) which makes up 8 million t that are not accounted for under plastic consumption. Further minor differences result from import and export volumes.

** The differences in plastic consumption and plastic waste generation volumes are mainly due to the lifetimes of durable products.


Zusammenfassung & Schlussfolgerung

- Für eine klimaneutrale Zukunft müssen Produktion, Nutzung und Entsorgung von Kunststoffen grundlegende geändert werden → weg von primären fossilen Rohstoffen
- Die herkömmlichen 3R Strategien (reduce, reuse, recycle) sind dazu essenziell, werden aber alleine nicht ausreichen. Zusätzliche Optionen:
 - Depolymerisierung / Solvolyse
 - Pyrolyse & Gasification
 - Carbon Capture & Utilisation (CCU)
 - Nutzung biogener Rohstoffe
- Es muss aber eine klare Hierarchisierung der Ansätze geben
 - Basierend auf Bedarf nach Energie und landwirtschaftlicher Fläche

2 entscheidende Knaptheiten auf dem Weg in eine klimaneutrale Zukunft

Lowest
Priority





Zusammenfassung & Schlussfolgerung

- Die inneren Kreisläufe müssen gestärkt werden
- Aber jeder einzelne Kreislauf hat Limitierungen. D.h. ab einem bestimmten Punkt muss der jeweils äußere Kreislauf “übernehmen”.

Zusammenfassung & Schlussfolgerung

- Ausdifferenzierung der Abfallhierarchie (v.a. für Kunststoffe)
- Grundlegende Überlegungen
 - Beibehaltung des 5-stufigen Systems
 - Erwägung dass Depolymerisierung / Solvolyse nicht in Konkurrenz mit mechan. Verfahren steht
- Grundlage für Steuerung
 - Z.B. Rezyklateinsatzquoten
 - Insgesamt 50%
 - 25% aus werkstoffl. Recycling





Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Clara Löw, Andreas Manhart, Günter Dehoust, Johannes Betz, Alexandra Möck, Andreas Köhler

